

抗がん剤名	投与量	投与方法	投与日
レジメン名 AFL+FOLFIRI			投与間隔 14 催吐リスク 中等度
アフリバルセプト	4mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1
備考			
レジメン名 BEV+FOLFIRI			投与間隔 14 催吐リスク 中等度
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1
備考			
レジメン名 BEV+IRIS			投与間隔 21 催吐リスク 中等度
ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1
テガフル/ギメラシル/オラシルK	80mg/m ²	2回/日	day1～14
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1
備考 テガフル/ギメラシル/オラシルK:1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			
レジメン名 BEV+SOX			投与間隔 21 催吐リスク 中等度
ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1
テガフル/ギメラシル/オラシルK	80mg/m ²	2回/日	day1～14
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1
備考 テガフル/ギメラシル/オラシルK:1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			
レジメン名 BEV+FTD/TPI			投与間隔 28 催吐リスク 中等度
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1,15
トリフルリジン/チピラシル	35mg/m ²	2回/日	day
備考 トリフルリジン/チピラシル:1回35mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay6朝食後まで内服。2日休薬。 Day8夕食後からDay13朝食後まで内服。2日休薬、その後14日間休薬する。			
レジメン名 BEV+CAPIRI			投与間隔 21 催吐リスク 中等度
ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1
カペシタビン	2000mg/m ²	2回/日	day1～14
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1
備考 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			
レジメン名 BEV+CAPOX			投与間隔 21 催吐リスク 中等度
ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1
カペシタビン	2000mg/m ²	2回/日	day1～14
オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	day1
備考 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			
レジメン名 BEV+Cape			投与間隔 21 催吐リスク 軽度
ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1
カペシタビン	2000mg/m ²	2回/日	day1～14
備考 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			

抗がん剤名	投与量	投与方法	投与日
レジメン名 BEV+mFOLFOX6			投与間隔 14 催吐リスク 中等度
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1

備考

レジメン名 BEV+mFOLFOXIRI			投与間隔 14 催吐リスク 高 度
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1

備考

レジメン名 BEV+sLV5FU2			投与間隔 14 催吐リスク 軽 度
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1

備考

レジメン名 CET+FOLFIRI			投与間隔 14 催吐リスク 中等度
セツキシマブ	400mg/m ² (初回のみ)	点滴静注	day1
セツキシマブ	250mg/m ²	点滴静注	day1,8
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1

備考

レジメン名 CET+Biweekly CPT-11			投与間隔 14 催吐リスク 中等度
セツキシマブ	400mg/m ² (初回のみ)	点滴静注	day1
セツキシマブ	250mg/m ²	点滴静注	day1,8
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1

備考

レジメン名 CET+mFOLFOX6			投与間隔 14 催吐リスク 中等度
セツキシマブ	400mg/m ² (初回のみ)	点滴静注	day1
セツキシマブ	250mg/m ²	点滴静注	day1,8
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1

備考

抗がん剤名	投与量	投与方法	投与日
レジメン名 CET+CAPOX			投与間隔 21 催吐リスク 中等度
セツキシマブ	400mg/m ² (初回のみ)	点滴静注	day1
セツキシマブ	250mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カペシタビン	2000mg/m ²	2回/日	day1~14
オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	day1
備考 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			
レジメン名 CET+SOX			投与間隔 21 催吐リスク 中等度
セツキシマブ	400mg/m ² (初回のみ)	点滴静注	day1
セツキシマブ	250mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
テガフル/ギメサル/オテサルK	80mg/m ²	2回/日	day1~14
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1
備考 テガフル/ギメサル/オテサルK:1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			
レジメン名 CET			投与間隔 7 催吐リスク 最小度
セツキシマブ	400mg/m ² (初回のみ)	点滴静注	day1
セツキシマブ	250mg/m ²	点滴静注	day1
備考			
レジメン名 ENCO+BINI+CET			投与間隔 7 催吐リスク 中等度
セツキシマブ	400mg/m ² (初回のみ)	点滴静注	day1
セツキシマブ	250mg/m ²	点滴静注	day1
エンコラフェニブ	300mg/回	1回/日	連日
ビニメチニブ	45mg/回	2回/日	連日
備考 ビニメチニブ:1回服用後12時間ほど空けてから次の服用をすること。			
レジメン名 ENCO+CET			投与間隔 7 催吐リスク 中等度
セツキシマブ	400mg/m ² (初回のみ)	点滴静注	day1
セツキシマブ	250mg/m ²	点滴静注	day1
エンコラフェニブ	300mg/回	1回/日	連日
備考			
レジメン名 FOLFIRI			投与間隔 14 催吐リスク 中等度
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1
備考			
レジメン名 IRIS			投与間隔 21 催吐リスク 中等度
テガフル/ギメサル/オテサルK	80mg/m ²	2回/日	day1~14
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1
備考 テガフル/ギメサル/オテサルK:1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			
レジメン名 PANI+FOLFIRI			投与間隔 14 催吐リスク 中等度
パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1
備考			

抗がん剤名	投与量	投与方法	投与日
レジメン名 PANI+Biweekly CPT-11			投与間隔 14 催吐リスク 中等度
パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1
備考			
レジメン名 PANI+mFOLFOX6			投与間隔 14 催吐リスク 中等度
パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1
備考			
レジメン名 PANI			投与間隔 14 催吐リスク 最小度
パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1
備考			
レジメン名 RAM+FOLFIRI			投与間隔 14 催吐リスク 中等度
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1
備考			
レジメン名 CAPIRI			投与間隔 21 催吐リスク 中等度
カペシタビン	2000mg/m ²	2回/日	day1～14
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1
備考	カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。		
レジメン名 mFOLFOXIRI			投与間隔 14 催吐リスク 高 度
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1
備考			
レジメン名 mFOLFOXIRI→maintenance			投与間隔 14 催吐リスク 軽 度
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1
備考			
レジメン名 sLV5FU2			投与間隔 14 催吐リスク 軽 度
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1
備考			
レジメン名 Pembro 200mg 【MSI-High】			投与間隔 21 催吐リスク 最小度
パンプロリズマブ	200mg/Body	点滴静注	day1
備考			

抗がん剤名	投与量	投与方法	投与日	
レジメン名 大腸-CAPOX			投与間隔 21	催吐リスク 中等度
カペシタビン	2000mg/m ²	2回/日	day1～14	
オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	day1	

備考 カペシタビン:1回1000mg/m²を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。

レジメン名 大腸-mFOLFOX6			投与間隔 14	催吐リスク 中等度
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1	

備考

レジメン名 大腸-SOX			投与間隔 21	催吐リスク 中等度
テガフル/キマラシル/オラシルK	80mg/m ²	2回/日	day1～14	
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	

備考 テガフル/キマラシル/オラシルK:1回40mg/m²を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。