

抗がん剤名	投与量	投与方法	投与日
レジメン名 SP			投与間隔 21 催吐リスク 高度
テガフル/ギマシル/オシラシK	80mg/m ²	2回/日	day1～14
シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	day1
備考 テガフル/ギマシル/オシラシK:1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			
レジメン名 胃-SOX			投与間隔 21 催吐リスク 中等度
テガフル/ギマシル/オシラシK	80mg/m ²	2回/日	day1～14
オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	day1
備考 テガフル/ギマシル/オシラシK:1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			
レジメン名 胃-CAPOX			投与間隔 21 催吐リスク 中等度
カペシタビン	2000mg/m ²	2回/日	day1～14
オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	day1
備考 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			
レジメン名 胃-mFOLFOX6			投与間隔 14 催吐リスク 中等度
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46hr)	day1
備考			
レジメン名 HER+SP			投与間隔 21 催吐リスク 高度
トラスツズマブ	8mg/kg(初回のみ)	点滴静注	day1
トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	day1
テガフル/ギマシル/オシラシK	80mg/m ²	2回/日	day1～14
シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	day1
備考 テガフル/ギマシル/オシラシK:1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			
レジメン名 HER+SOX			投与間隔 21 催吐リスク 中等度
トラスツズマブ	8mg/kg(初回のみ)	点滴静注	day1
トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	day1
テガフル/ギマシル/オシラシK	80mg/m ²	2回/日	day1～14
オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	day1
備考 テガフル/ギマシル/オシラシK:1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			
レジメン名 HER+CAPOX			投与間隔 21 催吐リスク 中等度
トラスツズマブ	8mg/kg(初回のみ)	点滴静注	day1
トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	day1
カペシタビン	2000mg/m ²	2回/日	day1～14
オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	day1
備考 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。			
レジメン名 Nivolumab 240mg/q2W			投与間隔 14 催吐リスク 最小度
ニボルマブ	240mg/Body	点滴静注	day1
備考			
レジメン名 Nivolumab 480mg/q4W			投与間隔 28 催吐リスク 最小度
ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	day1
備考			

抗がん剤名	投与量	投与方法	投与日	
レジメン名 Nivolumab+SOX			投与間隔 21	催吐リスク 中等度
ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	day1	
ﾏｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾏﾗｼﾙ/ﾎﾟﾗｼﾙK	80mg/㎡	2回/日	day1～14	
オキサリプラチン	100mg/㎡	点滴静注	day1	
備考 ﾏｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾏﾗｼﾙ/ﾎﾟﾗｼﾙK:1回40mg/㎡を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。				
レジメン名 Nivolumab+CAPOX			投与間隔 21	催吐リスク 中等度
ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	day1	
カペシタビン	2000mg/㎡	2回/日	day1～14	
オキサリプラチン	100mg/㎡	点滴静注	day1	
備考 カペシタビン:1回1000mg/㎡を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。				
レジメン名 Nivolumab+mFOLFOX6			投与間隔 14	催吐リスク 中等度
ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1	
オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	day1	
レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	day1	
5-FU	400mg/㎡	急速静注	day1	
5-FU	2400mg/㎡	持続静注(46hr)	day1	
備考				
レジメン名 RAM			投与間隔 14	催吐リスク 最小度
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1	
備考				
レジメン名 RAM+Weekly PTX			投与間隔 28	催吐リスク 軽 度
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1,15	
パクリタキセル	80mg/㎡	点滴静注	day1,8,15	
備考				
レジメン名 RAM+Weekly nab-PTX			投与間隔 28	催吐リスク 軽 度
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1,15	
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/㎡	点滴静注	day1,8,15	
備考				
レジメン名 Weekly PTX			投与間隔 28	催吐リスク 軽 度
パクリタキセル	80mg/㎡	点滴静注	day1,8,15	
備考				
レジメン名 Weekly nab-PTX			投与間隔 28	催吐リスク 軽 度
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/㎡	点滴静注	day1,8,15	
備考				
レジメン名 S-1+DTX			投与間隔 21	催吐リスク 中等度
ﾏｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾏﾗｼﾙ/ﾎﾟﾗｼﾙK	80mg/㎡	2回/日	day1～14	
ドセタキセル	40mg/㎡	点滴静注	day1	
備考 ﾏｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾏﾗｼﾙ/ﾎﾟﾗｼﾙK:1回40mg/㎡を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。				
レジメン名 T-Dxd			投与間隔 21	催吐リスク 中等度
トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	点滴静注	day1	
備考				