

抗がん剤名	投与量	投与方法	投与日	
レジメン名 Biweekly GEM			投与間隔 14	催吐リスク 軽 度
ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	day1	
備考				
レジメン名 GEM			投与間隔 28	催吐リスク 軽 度
ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	day1,8,15	
備考				
レジメン名 GEM+CDDP			投与間隔 21	催吐リスク 中等度
シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注	day1,8	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	day1,8	
備考				
レジメン名 GEM+CDDP+S1			投与間隔 14	催吐リスク 中等度
シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注	day1	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	day1	
テガフル/ギメサル/オラシルK	80mg/㎡	2回/日	day1～7	
備考 テガフル/ギメサル/オラシルK:1回40mg/㎡を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay8朝食後まで内服。				
レジメン名 GEM+S1			投与間隔 21	催吐リスク 中等度
ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	day1,8	
テガフル/ギメサル/オラシルK	80mg/㎡	2回/日	day1～14	
備考 テガフル/ギメサル/オラシルK:1回40mg/㎡を1日2回朝夕食後内服。Day1夕食後からDay15朝食後まで内服。				
レジメン名 GEM+nab-PTX			投与間隔 28	催吐リスク 中等度
ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	day1,8,15	
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	125mg/㎡	点滴静注	day1,8,15	
備考				
レジメン名 mFOLFIRINOX			投与間隔 14	催吐リスク 高 度
オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	day1	
イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	day1	
レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	day1	
5-FU	2400mg/㎡	持続静注(46hr)	day1	
備考				
レジメン名 nal-IRI+5FU/LV			投与間隔 14	催吐リスク 中等度
イリノテカン(リボソーム製剤)	70mg/㎡	点滴静注	day1	
レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	day1	
5-FU	2400mg/㎡	持続静注(46hr)	day1	
備考				